

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Δ.Ε.Β.Ε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΔ
(Από την Θεωρία στην Πράξη)



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Δ.Ε.Β.Ε
Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Καστοριάς

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
12-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
LIMNEON RESORT HOTEL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



CRESTOR[®]
rosuvastatin

**ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ**

ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Στη μελέτη METEOR
το **CRESTOR**[®]
επιβράδυνε σημαντικά
την εξέλιξη της
αθηροσκλήρωσης
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

CRE00051/0/0208

M. ΠΙΤΣΙΛΩΗΣ Α.Ε.

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.
Θεσοκοπούλου 4 & Αστροναυτών,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195
www.astrazeneca.gr

Χαιρετισμός προέδρου για την Διημερίδα της Δ.Ε.Β.Ε

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διαβητολογική Εταιρία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει σε συνεργασία με την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καστοριάς διημερίδα με θέμα


«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Από τη Θεωρία στην Πράξη»

και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά

Η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των προβλημάτων του αποτελεί την σύγχρονη ιατρική πρόσκληση και πρόκληση. Για τους λόγους αυτούς η ενημέρωση και η συνεχής εκπαίδευση στο θέμα αυτό των ιατρών και των ατόμων με Διαβήτη είναι επιτακτική.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Β.Ε
Τριαντάφυλλος Διδάγγελος



**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΣ ΔΕΒΕ**

Τρ. Διδάγγελος
Πρόεδρος

Εμ. Πάγκαλος
Αντιπρόεδρος

Κυρ. Καζάκος
Γραμματέας

Δημ. Σκούτας
Ταμίας

Δημ. Καραμήτσος

Χρ. Μανές

Χρ. Σαμπάνης

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λέτζος Χαρ

Σαμαράς Βασ.

Γκόγκου Αργ.

Μούντζου Μαρ.

Νάτος Αθαν.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4/2008

10:00 10:30 Έναρξη Χαιρετισμοί

10:30 12:00 Η αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας
Συν: **Ε. Πάγκαλος**

Παθογένεια ΣΔ 2 και στόχοι αντιμετώπισης
Χρ. Σαμπάνης

Φάρμακα στον ΣΔ
Δημ. Σκούτας

Αλγόριθμος αντιμετώπισης του ΣΔ
Κυρ. Καζάκος ←

12:00 12:30 Διάλειμμα

12:30 14:00 Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου
Συν: **Γ. Ανθιμίδης**

Συμμετοχή των παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου
Μιχ. Βασιλειάδης

Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Τσ. Μούσλεχ

Η δυσλιπιδαιμία στον ΣΔ
Γ. Δαμιανίδης

14:00 18:00 Γεύμα Διάλειμμα

18:00 19:30 Αντιμετώπιση των επιπλοκών του ΣΔ.

Συν: **Χαρ. Λετζος**

Αντιμετώπιση Διαβητικής Νεφροπάθειας
Σπ. Μπακατσέλος

Αντιμετώπιση Διαβητικής Νευροπάθειας
Χρ. Μανές

Η υπέρταση στον ΣΔ
Δεσ. Καραγιάννη

19:30 20:30 Συμπεράσματα ημερίδας - Συζήτηση
Δημ. Καραμήτσος, Τρ. Διδάγγελος

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4/2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΔ

(σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και
διαβητικών Ν. Καστοριάς)

**11: 00 13:00 Ο Σακχαρώδης Διαβήτης επιδημία που μπορεί να
αντιμετωπισθεί;**
Συν : **Τρ. Διδάγγελος , Εμ. Πάγκαλος**

Ο ρόλος της άσκησης και της διατροφής στην εμφάνιση και
αντιμετώπιση του ΣΔ
Γ. Κούρτογλου

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του τύπου 1 και
τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη
Κυρ. Καζάκος

Η πρόληψη της εμφάνισης ελκών στα πόδια των
διαβητικών
Λ. Δούκας

Ανθιμίδης Γεωρ.

Βασιλειάδης Μιχ.

Γκόγκου Αργ.

Δαμιανίδης Γ.

Διδάγγελος Τρ.

Δούκας Λ.

Καζάκος Κυρ.

Καραγιάννη Δεσ.

Καραμήτσος Δημ.

**Κούρτογλου Γ.
Λέτζος Χαρ**

Μανές Χρ.

**Μούντζου Μαρ.
Μούσλεχ Τσ.**

Μπακατσέλος Σπ.

**Νάτος Αθαν.
Πάγκαλος Εμμ.**

Σαμαράς Βασ.

Σαμπάνης Χρ.

Σκούτας Δημ.

Παθολόγος Διαβητολόγος, Αναπλ. Δ/ντης ΕΣΥ Γ.Ν.
Πολυγύρου

Επιμελητής Α', Α' Παθόλ Κλινική ΓΠΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Επιμελήτρια Β' Παθολογικής Κλινικής Νοσ.
Καστοριάς

Παθολόγος Διαβητολόγος Επιμελητής. Α' Νοσ.
Φλώρινας

Παθολόγος Διαβητολόγος, Λέκτορας Παθολογίας
Διαβητολογίας ΑΠΘ, Α' Προπ. Παθολογική κλινική
ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Νοσηλεύτης Διαβητολογικού Ιατρείου, Α' Παθόλ
Κλινική ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Παθολόγος Διαβητολόγος Επιστημονικός
Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Α'
Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν. Διευθύντρια ΕΣΥ,
Γ' Παν. Κλινική ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Α' Προπ Παθολ. Κλινικής ΓΠΝΘ
«ΑΧΕΠΑ»

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Κλινική «Αγιος Λουκάς»
Παθολόγος, Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Νοσ.
Καστοριάς

Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν Δ/ντής,
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Επιμελήτρια Β' Παθολ. Κλινικής Νοσ. Καστοριάς
Ενδοκρινολόγος, Επιστ. Συνεργάτης,
Διαβητολογικό Κέντρο Α' Παθολ. Κλινική Α.Π.Θ.,
ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Παθολόγος Διαβητολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, ΓΝΝ
Δράμας

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσ. Καστοριάς
Παθολόγος Διαβητολόγος, Δ/ντής Α' Παθόλ.
Κλινικής ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Επιμελητής Α' Παθολογικής Κλινικής Νοσ.
Καστοριάς

Παθολόγος Διαβητολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Αναπλ.
Δ/ντής Διαβητολογικού Κέντρου ΓΠΝΘ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Παθολόγος Διαβητολόγος, Επιστ. Συνεργάτης
Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Γενικές Πληροφορίες

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Δημερίδας
12-13 Απριλίου 2008 Ξενοδοχείο "LIMNEON RESORT HOTEL"

Η Γραμματεία για εξυπηρέτηση των συνέδρων θα λειτουργεί **απο 12/4 και από τις 09.00**

Τα πιστοποιητικά θα δίνονται **στη λήξη** της εκδήλωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής : **Δωρεάν**

Στον συμμετέχοντα θα δοθούν αναλυτικό πρόγραμμα, πιστοποιητικό συμμετοχής και καφές στο διάλειμμα.

Η Δημερίδα μοριοδοτείται με μόρια, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD).

Οπτικοακουστικά

Προβολή μόνο μέσω Η/Υ.

Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν και να ελέγχουν την παρουσίαση τους στο χώρο παραλαβής το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίας τους.

Κατά την διοργάνωση της Δημερίδας θα λειτουργεί έκθεση ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Γραμματεία Δημερίδας:

FORUM CONGRESS & TRAVEL

Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη 54624

Τηλ: 2310 257128, 2310 243588 Fax: 2310 231849

info@forumcongress.com www.forumcongress.com



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Byetta[®]
ένεση εξενατίδης

Το **BYETTA** επαναφέρει σε λειτουργία τα β-κύτταρα για αυτορρυθμιζόμενο γλυκαιμικό έλεγχο του Διαβήτη Τύπου 2



Με το **BYETTA** επιτυγχάνεται:

- Σταθερή μείωση της HbA1c
- Σταθερή μείωση του σωματικού βάρους



Το Byetta χορηγείται με προγεμισμένη πένα σε απλή και σταθερή δόση πριν το πρωινό και το βραδινό γεύμα ή τα δύο κύρια γεύματα της ημέρας (μεσολάβηση τουλάχιστον 6 ωρών).



Lilly

Όνομασία: BYETTA, 5 μικρογραμμάρια, ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη πένα και BYETTA, 10 μικρογραμμάρια, ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη πένα. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το BYETTA ενδείκνυται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σε συνδυασμό με μετροπρόλη ή/και σουλφονουρίες σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητικός γλυκαιμικός έλεγχος με τη μέγιστη ανεκτή δόση με τις παραπάνω από του στόματος αγωγές. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η θεραπεία με το BYETTA πρέπει να αρχίζει με δόση των 5 μg εξενατίδης δύο ημερησίως (BID) επί ένα μήνα τουλάχιστον, έτσι ώστε το φάρμακο να είναι καλύτερα ανεκτό. Προκειμένου να βελτιωθεί ο γλυκαιμικός έλεγχος περαιτέρω, η δόση της εξενατίδης μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί στα 10 μg δύο ημερησίως (BID). Δόσεις άνω των 10μg δύο ημερησίως δεν συνιστώνται. Το BYETTA μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή εντός του χρονικού διαστήματος των 60 λεπτών πριν από το πρωινό και πριν το βραδινό γεύμα (ή πριν τα δύο κύρια γεύματα της ημέρας, μεταξύ των οποίων πρέπει να μεσολαβούν 6 ή περισσότερες ώρες). Το BYETTA δεν πρέπει να χορηγείται μετά το γεύμα. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησια στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το BYETTA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Το BYETTA δε πρέπει να χορηγείται σε Τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη ινσουλinoθεραπείας λόγω ανεπάρκειας των β-κυττάρων. **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα:** Η δράση του BYETTA που είναι η επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης ενδέχεται να επιφέρει μείωση του βαθμού και του ρυθμού απορρόφησης των από του στόματος χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία. Τα περισσότερα επεισόδια ναυτίας ήταν ήπιες έως μέτριες εντάσης και είχαν αυτοεξομαζωμένο χαρακτήρα. Με τη συνέχιση της θεραπείας, η συχνότητα και η ένταση μειώθηκε στους περισσότερους ασθενείς που αρχικά εμφάνισαν ναυτία. **Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την ψυλάξη του προϊόντος:** Φυλάσσετε σε ψύξη (2 °C - 8 °C). Μην καταψύχετε. Κατά τη χρήση φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C. **Κατοχές άδειας κυκλοφορίας:** Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. **Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:** EU/1/06/362/001-2, ημερομηνία πρώτης εγκρίσης: 20 Νοεμβρίου 2006. **Τιμές:** Byetta 5μg, 142,44 € , Byetta 10μg, 142,44 €. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.