

 Δ.Ε.Β.Ε.

9^ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10 – 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ»

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Παρασκευή 10 Νοεμβρίου**Ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς»**

- 09.15–10.30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: *Παπάζογλου Ν.*
- 10.30–11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 11.00–12.15 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: *Κούρτογλου Γ.*
- 12.15–12.35 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 12.35–14.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: *Χαρσούλης Φ.*
- Νεώτερες απόψεις για το μεταβολισμό των υδατανθράκων
Διδάγγελος Τ.
 - Ο ρόλος των κυτοκινών στο σακχαρώδη διαβήτη
Σκαραγκάς Γ.
- 17.00–18.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: *Μανές Χ.*
- 18.00–19.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: *Ευθυμίου Η.*
- Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και σακχαρώδης διαβήτης
Γιώβος Ι.
 - Αυξητική ορμόνη και σακχαρώδης διαβήτης
Αβραμίδης Α.
- 19.00–19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 18.00–19.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: *Βολιώτης Κ.*
- Αυτόνομο νευρικό σύστημα και έκκριση γλυκαγόνης και ιν-
σουλίνης
Μανές Χ.
 - Έλλειψη αντίληψης υπογλυκαιμίας σε διαβητικούς υπό ιν-
σουλινοθεραπεία
Πάγκαλος Ε.

Σάββατο 11 Νοεμβρίου**Ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς»**

- 09.00–10.15 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: *Μπακατσέλος Σ.*
- 10.15–10.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 10.30–12.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: *Ζαμπούλης Χ.*
- Αντιυπερτασική θεραπεία στους διαβητικούς
Μπακατσέλος Σ.
 - Αντίσταση στην ινσουλίνη και υπέρταση. Νεώτερα δεδομένα
Παπαγαλάνης Ν.
- 12.00–12.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 12.20– 2.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύνδρομα οφειλόμενα σε γενετική βλάβη του μορίου της ιν-
σουλίνης ή του υποδοχέα της
Συντονιστής: *Γιώβος Ι.*
Εισηγητές: *Γιώβος Ι., Μούσλεχ Ζ., Καζάκος Κ.*
- 14.30–16.00 Γεύμα στο ξενοδοχείο
- 16.00–17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: *Αλεβίζος Μ.*
- 17.00–18.30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: *Παπαλεξίου Γ.*
- Η μικρολευκωματινουρία στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Σάϊλερ Ν.
 - Διάσωση οπτικής οξύτητας μετά από φωτοπηξία Laser
Νικολακόπουλος Α.
 - Αυτοέλεγχος στο σακχαρώδη διαβήτη
Κούρτογλου Γ.
- 18.30–19.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19.00 – 20.30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προεδρείο: *Καραμήτσος Δ.*

- Λιπιδαιμικοί – αιμορεολογικοί παράγοντες κινδύνου σε διαβητικούς ασθενείς

Μιχαϊλίδης Δ.

- Υπολιπιδαιμική θεραπεία σε διαβητικούς

Παπαδόπουλος Γ.


ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Μεταβολική και Αγγειακή Αγωγή του Διαβήτη

DIAMICRON[®]

gliclazide

- Το Diamicron ρυθμίζει την γλυκαιμία



- Το Diamicron βελτιώνει την οφθαλμολογική πρόγνωση

Δικαίωμα συμμετοχής 5.000 δρχ. με αποστολή ταχυδρομικής επιταγής
στη γραμματεία της ΔΕΒΕ:

Ν. Παπάζογλου
Μπαλταδώρου 8
546 31 - Θεσσαλονίκη

Ενδειξη: Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης. **Αντενδείξεις:** Ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης, βαριάς μορφής κέτωση, σέξωση, διαβητικό προκώμα και κόμα, εγκυμοσύνη, βαριάς μορφής νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Γαστρεντερικές διαταραχές. Ηπιες νευρολογικές εκδηλώσεις. Σπάνιες τοξικές επιδράσεις στο αιμοποιητικό σύστημα γενικά αντιστρεπτές (παροδική λευκοπενία, θρομβοπενία, ακοκκιωκυτταραιμία, απλαστική αναιμία, αιμολυτική αναιμία). **Αλληλεπιδράσεις:** Τα διουρητικά και τα βαρβιτουρικά μπορεί να μειώσουν τη δράση του φαρμάκου. Η υπογλυκαιμική του δράση μπορεί να ενισχυθεί από παράγωγα της πυραζόλης, σαλικυλικά, φαινυλβουταζόνη αντιβακτηριακές σουλφοναμίδες, β-αναστολείς και αναστολείς της ΜΑΟ. **Δοσολογία και Χορήγηση:** 2 δισκία των 80 mg ημερησίως στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε 1-4 δισκία ανάλογα με την ανταπόκριση της γλυκόζης του αίματος ΠΙΑΝΤΟΤΕ σε 2 λήψεις. **Υπερδοσολογία:** Το κύριο σύμπτωμα της είναι η υπογλυκαιμία, σε σοβαρές περιπτώσεις μείωσης της συνείδησης, είναι απαραίτητη η άμεση ενδοφλέβια χορήγηση υπέρτονου διαλύματος γλυκόζης (10% ή 30%). **Συσκευασία:** Κουτιά των 60 δισκίων.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ.

DIAMICRON[®]

2 δισκία την ημέρα
στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων

Les Laboratoires Servier
45520 Gidy - France

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
X & A Μουρκούση 10, 157 73 Ζωγράφου
Τηλ. 77 92 613